

Calendário de Imunização

 Vacinas	Crianças	Adolescentes	Adultos	Adultos mais velhos
COVID-19	✓	✓	✓	✓
BCG	✓			
Hepatite B	✓		Em caso de risco	
Haemophilus Influenzae Tipo B (HIB) Difteria, Tétano e Coqueluche Acelular (DTPa) ou Difteria, Tétano e DTP coqueluche de células inteiras	✓			
Tétano, Difteria e Coqueluche Acelular (dTpa)	✓	✓	Em casos especiais ou reforços	
Difteria e Tétano (dT)		✓		
Poliomielite Inativada (IPV)	✓			
Conjugado Pneumocócico (VPC)	✓			
Sarampo-Rubéola-Caxumba (SRP)	✓		Se não está imune	
Varicela (VAR)	✓		Se não está imune	
Influenza	Anual			
Rotavírus (VR)	✓			
Hepatite A (HepA)	✓		✓	
Papilomavírus Humano (HPV2 e HPV4)	✓	✓		
Meningite	✓		✓	✓
Febre Amarela	Pode ser necessário para viagens (pelo menos 4 a 6 semanas antes da viagem)			
Raiva	Pode ser necessário para viagens (pelo menos 4 a 6 semanas antes da viagem)			
Encefalite Japonesa	Pode ser necessário para viagens (pelo menos 4 a 6 semanas antes da viagem)			
Fiebre Tifoide	Pode ser necessário para viagens (pelo menos 4 a 6 semanas antes da viagem)			
Malária				

Fonte de informação:

<https://slife.org/web/calendario-vacunacion/>

<https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/adolescent-easyread.html>

<https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread.html>

<https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html>